



OFICIUL FITOSANITAR GALATI  
Str.Dragos Voda nr.13 Loc GALATI  
Telefon /Fax :0236/495244 , e-mail :ofgalati@anfof.ro



## BULETIN DE AVERTIZARE

Nr. 8 din 27.03.2025

*Condițiile climatice din ultima perioada au favorizat apariția și dezvoltarea daunatorului/bolii:*

*MONILIOZA(Monilia spp), CIURUIRE(Stigmina carpophylla), BASICAREA FRUNZELOR (TAPHRINA SPP), PATAREA ROSIE A FRUNZELOR (Polistigma rubrum), FAINARE (Podosphaera L)*

*Care pot cauza pierderi importante la culturile: SPECII POMICOLE SAMBUROASE (piersic,nectarin,cais,cires,prun,visin) CIURUIREA(Stigmina carpophylla) este cauzata de o ciuperca microscopica care afecteaza pomii samburosi (piersic, nectarin, cais, cires, prun, visin). Imbolnavirea pe scoarta si pe lastari se produce primava sub forma unor pete brune,izolate,circulare ( ovale dispuse in jurul mugurilor), tesuturile afectate se rup, in urma acestora aparand fenomenul de osmoza (secretii cleiose).*

*Monilioza este o boala cauzata de o ciuperca microscopica ,frecvent intalnita la pomii samburosi ,putanii . Ieșe mari pagube. Atacul de monilioza se manifesta pe ramuri, frunze, flori si fructe, primavera cauzand arsura moniliana, iar mai apoi putrezirea fructelor.*

*Pentru preventie si combatere se recomanda executarea tratamentului: 3,4*

*Numai unde s-au realizat urmatoarele conditii;*

*Temperatura aerului 2-20 °C*

*Monilioza-prezenta miceliului de ciuperca in fructele mumificate si in scoarta ramurilor.  
Ciuruire-prezenta cleiului cu spori de ciuperca pe ramuri.*

*Folositi unul din produsele de mai jos dupa caz:*

- 1.BOUILLIE BORDELAISE WDG -0, 5% (5,0 kg/ha): (ciuruirea micotica a frunzelor si monilioza) sau
- 2.CUPROFIX ULTRA - 0,6% (6,0 kg/ha): (ciuruirea frunzelor, basicarea frunzelor, ciuruirea bacteriana, patarea bacteriana )sau
- 3.CUPROXAT FLOVABLE(KUPFEROL) - 0,35% (3,5 litri/ha : (monilioza) sau
- 4.FYTOSAVE: 2,0 l/ha(Fainare) sau
- 5.JAVISE50 WG/TOP SENT EXTRA: 0,5 kg/ha(Monilioza)

### ALTE PRODUSE DE PROTECTIE A PLANTELOR OMologate PE TERITORIUL ROMANIEI

Masuri alternative de combatere : igiena culturala(igiena riguroasa a ramurilor) toamna se vor aduna si distrug fructele mumificate ramase in pomi ; ramurile atacate eliminate din coroana in urma taiierilor vor fi distruse preferabil prin ardere. Metode durabile : biologice, fizice, mecanice si alte metode nechimice trebuie preferate metodelor chimice, daca acestea asigura control corespunzator organismelor daunatoare.

Perioada optima de tratament:*Tratamentul 1-dezmugurit(button verde)la prun, cires, visin*

*Tratamentul 2-in fază de buton albsi infoierea coroiei- la prun ,cires,visin,cais*

*Intervalul minim dintre tratamente este 7 zile.*

ATENTIE !RESPECTATI CONDIȚIILE DE DEPOZITARE, MANIPULARE SI UTILIZARE A PRODUSELOR DE PROTECTIE A PLANTELOR IN FORMA TATIILE AGRICOLE,CONFORM "GHIDULUI DE BUNE PRACTICI DE UTILIZARE SI DEPOZITARE A PRODUSELOR DE PROTECTIE A PLANTELOR", ELABORAT DE AUTORITATEA NAȚIONALĂ FITOSANITARĂ.

Se recomanda a se consulta site-ul <http://www.madr.ro/norme-de-eco-conditionalitate-in-domeniul-fitosanitar.html>.

Toate tratamentele fitosanitare efectuate se vor inregistra in Registrul de evidenta a tratamentelor cu PPP- pe culturi si se vor pastra pe o perioada de cel putin 3 ani. Aceasta cerinta este obligatorie conf. Ord 352 / 2015 privind normele de ecoconditionalitate in cadrul schemelor si măsurilor de sprijin pentru fermieri in Romania ( SMR 7 si 8). Conform HG.1230/2012 art.3 alin 2, nerespectarea de catre utilizatorii profesionisti a prevederilor art. 67,alin 1 din Reg (CE) 1107/2009 privind mentinerea evidentei pe o perioada de cel putin 3 ani a PPP pe care le utilizeaza se sanctioneaza cu amenda de la 8000 la 10 000 lei.

*Luați masurile ce se impun pentru protecția mediului înconjurător.* Citiți cu mare atenție instrucțiunile de pe eticheta produsului de protecție a plantelor, inclusiv recomandările privind compatibilitatea produselor utilizate la tratamentele fitosanitare!Luați măsurile ce se impun pentru protecția mediului înconjurător!Respectați cu strictețe normele de protecție și securitate a muncii.Protejați familiile de albine împotriva intoxicațiilor cu produse de protecție a plantelor conform Legii nr.383/2013 a apiculturii, cu modificările și completările ulterioare, Ordinului nr.127/1991 al ACA din România, Ordinului comun nr.45/1991 al Ministerului Agriculturii și Alimentației 15b/3404/1991/ al Departamentului pentru Administrație Locală și 1785/TB/ al Ministerului Transporturilor, precum și Protocolului de colaborare nr. 328432/2015, încheiat cu ROMPIS privind implementarea legislației.Respectați prevederile Ordinului Ministrului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, al Ministrului Mediului, Apelor și Pădurilor și al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Singuranța Alimentelor nr.352/636/54/2015 pentru aprobatia normelor privind ecocondiționalitatea in cadrul schemelor si măsurilor de sprijin pentru fermieri in Romania, cu modificarile ulterioare.BULETINELE DE AVERTIZARE VOR FI AFISATE IN LOCURI VIZIBILE PENTRU A PUTEA FI ACCESIBILE TUTUROR CELOR INTERESATI.

Responsabil Prognoza si Avertizare,

Silvia Hartuche

