

OFICIUL FITOSANITAR GALATI

Str. Dragos Voda nr.13 Loc GALATI

Telefon /Fax :0236/495244

e-mail :ofgalati@anfof.ro

BULETIN DE AVERTIZARE

Nr.24.din14.05.2025



Condițiile climatice din ultima perioada au favorizat aparitia si dezvoltarea daunatorului/bolii:

PATAREA CAFENIEA FRUNZELOR DE TOMATE (*Cladosporium fulvum*) **MANA TOMATELOR** (*Phytophthora infestans*)+
MOLIA MINIERA A TOMATELOR (*Tuta absoluta*) ,**AFIDE**, **PAIANJENI** , **ALTI DAUNATORI**

Care pot cauza pierderi importante la culturile: **TOMATE**(Ciclul I de productie –spatii protejate)
Patarea cafenie a frunzelor de tomate.



Atacul incepe pe **frunzele bazale**, apoi progresaaza si pe frunzele din etajele superioare. Pe partea superioara a frunzelor apar pete mici, de culoare galbuie, care se maresc in diametru si devin galbene. Pe partea inferioara a frunzelor in dreptul petelor apare un puf alb, care devine cafeniu si in final brun-violaceu. Este format din conidioforii si conidiile ciupercii. In conditii favorabile de mediu, in cazul unor atacuri puternice, petele conflueaza. Tesuturile atacate se brunifica si se necrozeaza, iar frunzele se usuca, ceea ce determina debilitarea plantelor. **Agentul patogen** este *Cladosporium fulvum*. Transmiterea acestui de la un an la altul se face prin miceliul de rezistenta din organele afectate sau prin conidiile care rezista in conditiile spatiilor protejate.

Mana tomatelor (*Phytophthora infestans*)

-atacul se manifesta pe toate organele aeriene ale plantelor: frunze, tulpini, flori, fructe; la varful frunzelor sau pe marginea acestora apar pete mari, de forma neregulata, de culoare verzuie, cu aspect „de opărit” in conditii de umiditate atmosferică ridicată in dreptul petelor se observă un puf fin albicios; cu timpul, zonele atacate se brunifică apoi se necrozează, iar frunzele se usuca; pe tulpina apar pete brune uleioase;
-fructele sunt infectate incepand cu primele faze de dezvoltare pana aproape de maturare; atacul debutează, de regula, la locul de inserție a pedunculului sub forma unor pete mari de culoare brun-măslinie care se măresc, devin brune și cuprind fructele in ntregime; fructele au aspect rugos sunt țari la pipăit, se desprind și cad prematur ca urmare a putezirii pedunculului.




Musculita alba de sera (*Trialeurodes vaporariorum*)-denumita si musculita alba de sera,este un daunator caracteristic culturilor crescute in spatii protejate.Are 3 etape de dezvoltare:ou,4 stadii larvare si adult,toate etapele avand loc pe partea inferioara a frunzei .Adultii si larvele musculitei albe invadeaza frunzele,mai ales lastarii pe care le inteapa si le sug seva din tesuturi,fapt care conduce la ingalbenirea frunzelor,care se usuca si cad. Adultii prezinta un vector de transmitere




pentru virusi.

Paianjenul (acarianul) rosu (*Tetranychus urticae*)



Prezinta 6-10 generatii pe an in spatiile inchise si in zonele calde .In spatiile protejate ierneaza in stare activa in toate cele 3 stadii de dezvoltare ,ou, larva si adult, mai ales ca femela (masculii fiind in general mai rari), in resturile vegetale , pe buruieni uscate sau in stratul superficial al solului.Este un daunator frecvent in anii secetosii,prefera partea inferioara a frunzelor,de unde larvele si adultii absorb prin intepare sucii celulari.Pe partea superioara a frunzelor in zonele de atac apar zone punctiforme de decolorare localizate in special de-a lungul nervurilor, frunzele devin rigide si casante,se usuca si cad.Pe partea inferioara a frunzelor se constata o tesatura matasoasa maronie si prezinta numeroase oua, larve si adulti in plina activitate.

Afidele



Sunt specii polifage, ce migreaza de la o planta la alta sau de la o specie la alta. Acestea cresc pe flora sponta, iar apoi se deplaseaza pe speciile cultivate. Se prezinta sub forma de colonie pe partea inferioara a frunzelor, pe flori sau inflorescente si pe lastarii tineri. Plantele atacate stagneaza, se ingalbenesc si devin sensibile la atacul ciupercilor. Hranirea afidelor cu suc celular al plantelor este urmata de acoperirea frunzelor cu excrementele dulci ale acestora, formand asa-numita "roua de miere", ce permite instalarea ciupercilor saprofite si formarea fumaginei.

Pentru prevenire si combatere se recomanda executarea tratamentului: 9, 10

Numai unde s-au realizat urmatoarele conditii;

temperaturi mai mari de 15-20°C, :umiditate>75%(ceata,roua,apa libera)

-aparitia daunatorilor in cultura

Folositi unul din produsele sau din amestecurile de mai jos dupa caz:

1.ORTIVA TOP/ SIMPLA :1,0 litri/ha+ AFFIRM TOP 1,5kg/ha sau

2.VITRA 50WP/CUPRIDIN:1,5-2,0kg/ha+ AFFIRM :1,5 kg/ha sau

3.CUPROFIX ULTRA /NOVICURE:1,6-2,4 kg/ha+ MOSPILAN 20SP/GAZELLE:0,250kg/ha sau

4.ALCUPRAL 50PU:1,5-2,0kg/ha+ MOSPILAN 20SG/KRIMA 20SG:0,250 kg/ha sau

ALTE PRODUSE DE PROTECTIE A PLANTELOR OMOLOGATE PE TERITORIUL ROMANIEI

Masuri alternative de combatere : monitorizarea culturii prin instalarea capcanelor care au rol de a pune in evidenta prezenta daunatorilor dar si de colectare a indivizilor ;asigurarea etansietatii spatiilor protejate si utilizarea plaselor de insecte ;smulgerea si distrugerea prin ardere a plantelor suspecte a fi infestate/infectate.

Metode durabile : biologice,fizice,mechanice si alte metode nechimice trebuie preferate metodelor chimice, daca acestea asigura control corespunzator organismelor daunatoare.

Perioada optima de tratament; cand se realizeaza conditiile de mai sus

Alte recomandari : ; Monitorizarea culturii de tomate prin instalarea capcanelor care au rol de a pune in evidenta prezenta daunatorilor dar si colectarea indivizilor.

Asigurarea etansietatii spatiilor protejate prin utilizarea plaselor de insecte.Se va evita excesul de umiditate si se va asigura o buna aerisire. Tratamentul se va repeta dupa 8-10 zile,se va evita aplicarea tratamentului la temperaturi mai mari de 25 °C.

REGULA-NU SE FAC DOUA TRATAMENTE LA RAND CU ACELAS PRODUS DE PROTECTIE A PLANTELOR.

ATENTIE !RESPECTATI CONDITIILE DE DEPOZITARE,MANIPULARE SI UTILIZARE A PRODUSELOR DE PROTECTIE A PLANTELOR IN EXPLOATATIILE AGRICOLE,CONFORM"GHIDULUI DE BUNE PRACTICI DE UTILIZARE SI DEPOZITARE A PRODUSELOR DE PROTECTIE A PLANTELOR",ELABORAT DE AUTORITATEA NATIONALA FITOSANITARA.

Se recomanda a se consulta site-ul <http://www.madr.ro/norme-de-eco-conditionalitate-in-domeniul-fitosanitar.html>.

Toate tratamentele fitosanitare efectuate se vor inregistra in Registrul de evidenta a tratamentelor cu PPP- pe culturi si se vor pastra pe o perioada de cel putin 3 ani.Aceasta cerinta este obligatorie conf. Ord 352 / 2015 privind normele de ecoconditionalitate in cadrul schemelor si masurilor de sprijin pentru fermieri in Romania (SMR 7 SI 8). ConformHG.1230/2012 art.3 alin 2,nerespectarea de catre utilizatorii profesioniști a prevederilor art. 67,alin 1 din Reg (CE) 1107/2009privind mentinerea evidentei pe o perioada de cel putin 3 ani a PPP pe care le utilizeaza se sanctioneaza cu amenda de la 8000 la 10 000 lei.

Luati masurile ce se impun pentru protectia mediului inconjurator. Citiți cu mare atentie instructiunile de pe eticheta produsului de protectie a plantelor, inclusiv recomandările privind compatibilitatea produselor utilizate la tratamentele fitosanitare!Luati masurile ce se impun pentru protectia mediului inconjurator!Respectati cu strictete normele de protectie si securitate a muncii.Protejati familiile de albine impotriva intoxicatiilor cu produse de protectie a plantelor conform Legii nr.383/2013 a apiculturii, cu modificările si completările ulterioare, Ordinului nr.127/1991 al ACA din România, Ordinului comun nr.45/1991 al Ministerului Agriculturii si Alimentatiei 15b/3404/1991/ al Departamentului pentru Administratie Locala si 1786/TB/ al Ministerului Transporturilor, precum si Protocolului de colaborare nr. 328432/2015, incheiat cu ROMPIS privind implementarea legislatiei.Respectati prevederile Ordinului Ministrului Agriculturii si Dezvoltării Rurale nr. 297/2017 privind aprobarea Codului de bune practici privind utilizarea în siguranță a produselor de protectie a plantelor.Respectati obligatiile ce va revin conform Ordinului Ministrului Agriculturii si Dezvoltării Rurale, al Ministrului Mediului, Apelor si Padurilor si al presedintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare si pentru Siguranța Alimentelor nr.352/636/54/2015 pentru aprobarea normelor privind ecocondiționalitatea în cadrul schemelor si masurilor de sprijin pentru fermieri in Romania, cu modificările ulterioare.**BULETINELE DE AVERTIZARE VOR FI AFISATE IN LOCURI VIZIBILE PENTRU A PUTEA FI ACCESIBILE TUTUROR CELOR INTERESATI.**

Responsabil Prognostica si Avertizare,
Ing. Daniela Viorica Vilcu

