

OFICIUL FITOSANITAR GALATI

Str.Dragos Voda nr.13 Loc GALATI

Telefon /Fax :0236/495244

e-mail :ofgalati@anfof.ro

**BULETIN DE
AVERTIZARE**

Nr.30.din21.05.2025



Condițiile climatice din ultima perioadă au favorizat apariția și dezvoltarea daunatorului/bolii:

PATAREA ROSIE, MONILIOZA, CIURUIRE + VIERMELE PRUNELOR (Cydia funebrana), VIERȘPEA SEMINTELOR DE PRUN (*Eurytoma schreinerii*), AFIDE, ALTI DAUNATORI

Care pot cauza pierderi importante la culturile: PRUN

Patarea rosie a frunzelor de prun (Polystigma rubrum)

Începând cu luna mai pe frunze apar pete circulare, de culoare verde galbui, cu diametrul 5-20 mm, care treptat devin roșu-caramiziu. În dreptul petelor, țesutul este casant, îngrosat și bombat spre partea inferioară a limbului. Frunzele pot fi compelt acoperite de pete roșii în cazul atacurilor puternice. Petele se închid la culoare spre sfârșitul verii și frunzele cad prematur. Ciuperca iernează pe frunzele atacate.

Monilioza este o boală cauzată de o ciuperca microscopică, frecvent întâlnită la pomii samburoși, putând produce mari pagube. Atacul de monilioza se manifestă pe ramuri, frunze, flori și fructe, primăvara, cauzând arsura moniliniiană, iar mai apoi putrezirea fructelor.

CIURUIREA (*Stigmata carpophylla*) este cauzată de o ciuperca microscopică care afectează pomii samburoși (piersic, nectarin, cais, cires, prun, visin). Îmbolnavirea pe scoartă și pe lăstari se produce primăvara sub forma unor pete brune, izolate, circulare (ovale dispuse în jurul mugurilor), țesuturile afectate se rup, în urma acestora aparând fenomenul de osmoza (secretii cleioase)

Viermele prunelor (Cydia funebrana)

Daunatorul prezintă 2 generații pe an și iernează în stadiul de larvă, în interiorul unui cocon matasos, la baza pomilor pe sub frunzele cazute sau în crapături ale scoartei, larvele primei generații se hrănesc cu samburii fructelor verzi, care în urma atacului nu se mai dezvoltă și cad. Larvele celei de a II-a generație se hrănesc cu fructele aflate în fază de coacere, în care sapă galerii în jurul samburilor în care lasă resturi de hrană și excremente brun-negricioase. Picăturile de goma (clei), prezente pe fructe, sunt caracteristice acestui daunator. A II-a generație poate produce pierderi de până la 80%.



Vierșpea semintelor de prun *Eurytoma schreinerii*

Prezintă o singură generație pe an. Iernează în stadiu de larvă, în samburii fructelor cazute pe sol, sau în cele rămase în pom. Adultii apar la sfârșitul lunii aprilie-începutul lunii mai, au un zbor greoi, deplasându-se pe distanțe mici. La 4-6 zile de la apariție, are loc depunerea ouălor, a caror incubatie durează 15-30 de zile. Larvele se hrănesc cu samanta

din interiorul endocarpului. Fructele de prun atacate se dezvoltă mai slab, au o culoare puțin mai închisă iar în perioada maturizării încep să cadă.



Pentru prevenire și combatere se recomandă executarea tratamentului; 5 și 6

Numai unde s-au realizat următoarele condiții;

-Impact climatic-temperaturi ridicate, ceată, rouă, apă liberă, favorizează apariția bolilor.

-criteriul biologic, criteriul fenologic

Folositi unul din produsele sau din amestecurile de mai jos după caz:

1. ALCUPRAL 50PU: 2,0 kg/ha + AFFIRM OPTI : 2,5 kg/ha sau

2. CAPTAN 80 WG/CAIMAN: 1,5 kg/ha + DELTAGRI / (FASTER DELTA): 0,3 litri/ha sau

3. ORIUS 25EW/ SALVATOR 25 EW: 0,07-0,1% + MOSPILAN 20 SG / (KRIMA 20 SG: 0,450kg/ha sau

4. FLOWBRIX/ (COPPER-FIELD: 3,3 l/ha + MAVRIK 2 F / (EVURE): 0,5 litri/ha sau

5. VITRA 50 WP/ (CUPRIDIN: 1,5-2,0 kg/ha + LASER 240 SC/ (NEXSUBA): 0,6 litri/ha sau

ALTE PRODUSE DE PROTECȚIE A PLANTELOR OMOLOGATE PE TERITORIUL ROMÂNIEI

Măsuri alternative de combatere igiena culturală (igiena riguroasă a ramurilor); toamna se vor aduna și distruge fructele mumificate rămase în pomi; ramurile atacate eliminate din coroană în urma tăierilor vor fi distruse, preferabil prin ardere.

Metode durabile : biologice, fizice, mecanice și alte metode nechimice trebuie preferate metodelor chimice, dacă acestea asigură control corespunzător organismelor dăunătoare.

Perioada optimă de tratament; când sunt îndeplinite condițiile de mai sus

Alte recomandări : Tratamentul se efectuează pe timp liniștit fără precipitații și se va repeta după 10 zile .

REGULA-NU SE FAC DOUA TRATAMENTE LA RAND CU ACELAS PRODUS DE PROTECȚIE A PLANTELOR.

ATENȚIE !RESPECTAȚI CONDIȚIILE DE DEPOZITARE, MANIPULARE ȘI UTILIZARE A PRODUSELOR DE PROTECȚIE A PLANTELOR ÎN EXPLOATĂȚIILE AGRICOLE, CONFORM "GHIDULUI DE BUNE PRACTICI DE UTILIZARE ȘI DEPOZITARE A PRODUSELOR DE PROTECȚIE A PLANTELOR", ELABORAT DE AUTORITATEA NAȚIONALĂ FITOSANITARĂ.

Se recomandă a se consulta site-ul <http://www.madr.ro/norme-de-eco-conditionalitate-in-domeniul-fitosanitar.html>.

Toate tratamentele fitosanitare efectuate se vor înregistra în **Registrul de evidență a tratamentelor cu PPP- pe culturi și se vor păstra pe o perioadă de cel puțin 3 ani.** Această cerință este obligatorie conf. Ord 352 / 2015 privind normele de ecocondiționalitate în cadrul schemelor și măsurilor de sprijin pentru fermieri în România (SMR 7 și 8). Conform HG.1230/2012 art.3 alin 2, nerespectarea de către utilizatorii profesioniști a prevederilor art. 67, alin 1 din Reg (CE) 1107/2009 privind menținerea evidenței pe o perioadă de cel puțin 3 ani a PPP pe care le utilizează se sancționează cu amendă de la 8000 la 10 000 lei.

Luati măsurile ce se impun pentru protecția mediului înconjurător. Citiți cu mare atenție instrucțiunile de pe eticheta produsului de protecție a plantelor, inclusiv recomandările privind compatibilitatea produselor utilizate la tratamentele fitosanitare! **Luati măsurile ce se impun pentru protecția mediului înconjurător!** Respectați cu strictețe normele de protecție și securitate a muncii. Protejați familiile de albine împotriva intoxicațiilor cu produse de protecție a plantelor conform Legii nr.383/2013 a apiculturii, cu modificările și completările ulterioare, Ordinului nr.127/1991 al ACA din România, Ordinului comun nr.45/1991 al Ministerului Agriculturii și Alimentației 15b/3404/1991/ al Departamentului pentru Administrație Locală și 1786/TB/ al Ministerului Transporturilor, precum și Protocolului de colaborare nr. 328432/2015, încheiat cu ROMPIS privind implementarea legislației. Respectați prevederile Ordinului Ministrului Agriculturii și Dezvoltării Rurale nr. 297/2017 privind aprobarea Codului de bune practici privind utilizarea în siguranță a produselor de protecție a plantelor. Respectați obligațiile ce vă revin conform Ordinului Ministrului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, al Ministrului Mediului, Apelor și Pădurilor și al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr.352/636/54/2015 pentru aprobarea normelor privind ecocondiționalitatea în cadrul schemelor și măsurilor de sprijin pentru fermieri în România, cu modificările ulterioare. **BULETINELE DE AVERTIZARE VOR FI AFISATE ÎN LOCURI VIZIBILE PENTRU A PUTEA FI ACCESIBILE TUTUROR CELOR INTERESAȚI.**

Responsabil Prognoza și Avertizare,
Ing. Daniela Viorica Vilcu