

Str.Dragos Voda nr.13 Loc GALATI

Telefon /Fax :0236/495244

e-mail :ofgalati@anf.ro

BULETIN DE AVERTIZARE

Nr.25.din26.05.2026




Condițiile climatice din ultima perioadă au favorizat apariția și dezvoltarea dăunătorului/bolii:


Boli foliare în complex: Fainare(*Erysiphe graminis*), Septorioza(*Septoria tritici*) Helmintosporioza(*Helminthosporium tritici*), Rugini(*Puccinia recondite-Puccinia striiformis, etc.*)+ Ploșnița cerealelor (*Eurygaster spp.larve*), Gândacul bălos(*Oulema melanopa*), Afide ,alți dăunători

Care pot cauza pierderi importante la culturile: CEREALE PĂIOASE (Grâu,Orz,Orzoaică)
Pentru prevenire și combatere se recomandă executarea tratamentului; 2


Septorioza





Rugina




Fainare



Ploșnița cerealelor –adult-




Ouă de ploșnița cerealelor



Larve -stadiul I -de ploșnița cerealelor

Gândacul bălos. Gândacul bălos are o singură generație pe an. Adulții rod frunzele plantelor tinere, perforându-le sub forma unor dungii longitudinale scurte, paralele cu nervurile. Larvele rod epiderma superioară și parenchimul frunzelor, tot sub forma de dungii longitudinale, iar epiderma inferioară se usucă, albindu-se. Atacul se produce în vetre și se observă de la distanță. Atacă de obicei ovăzul dar și orzul și alte graminee. Tratamentele se fac la avertizare împotriva insectelor adulte, înainte de depunerea ouălor. Larvele se combat când au eclozat în majoritate, în primele stadii de dezvoltare.



Numai unde s-au realizat următoarele condiții;

Cultura prezintă atac de boli foliare:-când se realizează o densitate de 3 larve de vârsta a III-a/mp la grâul de sămânță, 5 larve de varstă a III-a/mp la grâul de consum.

Folosiți unul din produsele de mai jos după caz:

1. **TEBUSTAR EW/MYSTIC TOP:** 05 litri/ha + **MOSPILAN 20 SG/ KRIMA :** 0,100 kg/ha sau
2. **KING 250 EW/TEBUSHA 250EW:** 0,5litri/ha + **KARATE ZEON /NINJA SG :** 0,15litri/ha sau
3. **ORIUS 25 EW/SALVATOR 25 EW:** 0,5 litri/ha + **LAMDEX EXTRA/ REXARIS 25 WG:** 0,3kg/ha sau
4. **PROSARO 250 EW:** 0,75 litri/ha + **DELTAGRI/FASTER DELTA :** 0,3 kg/ha sau
- 5 **TEBUCUR 250 EW:** 0,5kg/ha + **MAVRIK 2F/EVURE:** 0,2 litri/ha sau

Alte produse de protecție a plantelor omologate pe teritoriul României .

Metode durabile : biologice, fizice, mecanice și alte metode nechimice trebuie preferate metodelor chimice, dacă acestea asigură control corespunzător organismelor dăunătoare.

Perioada optimă de tratament; - deschiderea ultimei teci până la sfârșitul înspicatului

-când majoritatea larvelor sunt de vârsta a III-a.

Alte recomandări : Producătorii agricoli să controleze lanurile de grâu și să efectueze tratamentul pentru combaterea ploșnitei cerealelor (larve) pe suprafețele unde s-au realizat condițiile de mai sus. Luați măsurile care se impun pentru protejarea coloniilor de albine. **Atenție!** Respectați condițiile de depozitare, manipulare și utilizare a produselor de protecție a plantelor în exploatațile agricole conform-Ghidului de bune practici de utilizare și depozitare a produselor de protecție a plantelor, elaborat de Autoritatea Națională Fitosanitară.

Se recomandă a se consulta site-ul <http://www.madr.ro/norme-de-eco-condiționalitate-in-domeniul-fitosanitar.html>.

Toate tratamentele fitosanitare efectuate se vor înregistra în Registrul de evidență a tratamentelor cu PPP- pe culturi și se vor păstra pe o perioadă de cel puțin 3 ani. Această cerință este obligatorie conf. Ord 352 / 2015 privind normele de ecocondiționalitate în cadrul schemelor și măsurilor de sprijin pentru fermieri în România (SMR 7 și 8). Conform HG.1230/2012 art.3 alin 2, nerespectarea de către utilizatorii profesioniști a prevederilor art. 67, alin 1 din Reg (CE) 1107/2009 privind menținerea evidenței pe o perioadă de cel puțin 3 ani a PPP pe care le utilizează se sancționează cu amendă de la 8000 la 10 000 lei.

Luați măsurile ce se impun pentru protecția mediului înconjurător. Citiți cu mare atenție instrucțiunile de pe eticheta produsului de protecție a plantelor, inclusiv recomandările privind compatibilitatea produselor utilizate la tratamentele fitosanitare! Luați măsurile ce se impun pentru protecția mediului înconjurător! Respectați cu strictețe normele de protecție și securitate a muncii. Protejați familiile de albine împotriva intoxicațiilor cu produse de protecție a plantelor conform Legii nr.383/2013 a apiculturii, cu modificările și completările ulterioare, Ordinului nr.127/1991 și al ACA din România, Ordinului comun nr.45/1991 al Ministerului Agriculturii și Alimentației 15b/3404/1991/ al Departamentului pentru Administrație Locală și 1786/TB/ al Ministerului Transporturilor, precum și Protocolului de colaborare nr. 328432/2015, încheiat cu ROMPIS privind implementarea legislației. Respectați prevederile Ordinului Ministrului Agriculturii și Dezvoltării Rurale nr. 297/2017 privind aprobarea Codului de bune practici privind utilizarea în siguranță a produselor de protecție a plantelor. Respectați obligațiile ce vă revin conform Ordinului Ministrului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, al Ministrului Mediului, Apelor și Pădurilor și al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr.352/636/54/2015 pentru aprobarea normelor privind ecocondiționalitatea în cadrul schemelor și măsurilor de sprijin pentru fermieri în România, cu modificările ulterioare.

Buletinele de avertizare vor fi afișate în locuri vizibile pentru a putea fi accesibile tuturor celor interesați .

Responsabil Prognoză și Avertizare,
Daniela Viorica Vilcu